

# PROTOCOLO PARA TRATAMIENTO DE OLIVOS AFECTADOS DE TUBERCULOSIS

SERCOPAG ASESORÍA AGRÍCOLA  
WWW.SERCOPAG.COM

## PEROSER PLATA PARA DESINFECCIÓN DE OLIVAR

PRODUCTO A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 50% CON PLATA COLOIDAL

### PROCEDIMIENTO PARA OLIVOS AFECTADOS CON BACTERIA PSEUDOMONA SAVASTANOI

- NO REALIZAR CORTES cuando haya periodos de lluvias.
- REALIZAR podas que favorezcan **la aireación de las ramas** y que **no se rocen mucho entre ellas**.
- En la poda, asegurarse de quitar la mayor parte de ramas afectadas por tuberculosis. De no ser posible quitarla en su totalidad, dejar la de tamaño más pequeño y que no se roce con el resto de planta sana.
- Tras la poda, realizar un tratamiento con PEROSER plata al 5%(en mochila 1 litro de producto) y pulverizar bien todas las ramas y restos de verrugas que hayan quedado.
- A los 10-12 días repetir el tratamiento del 5% en el olivar afectado.
- En primavera cuando la planta vuelva a mover savia, volver a realizar el tratamiento. Esta vez a **dosis del 2,5%** (medio litro de producto a la mochila de 15-16 litros)
- Si tiene alrededor más olivos, se recomienda pulverizar el producto al 1% tras la poda o ALTERNAR tratamientos de cobre al 50% para prevenir que el resto se infecten. Este tratamiento podría hacerlo en periodo continuado de mucha humedad y nieblas, hacerlo en días que pueda tratar, con tiempo seco y calmado.